

# Vaccin in het kort voor het **DKTP-Hib-HepB** vaccin

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je kind tegen verschillende ziektes:

- **Difterie.** Dit is een ernstige ontsteking van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Kinkhoest.** Dit is een ontsteking van de neus, keel en longen. Klachten zijn onder andere veel hoesten en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Dit kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.
- **Polio.** Dit kan zorgen voor een verlamming van de armen of benen.
- **Haemophilus influenzae type b (Hib).** Dit kan zorgen voor een ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking), de longen en de keel.
- **Hepatitis B.** Dit kan zorgen voor een ontsteking van de lever. Klachten zijn onder andere moe voelen en koorts. Ook kan het oogwit en de huid geel worden.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van je kind de bacteriën en virussen die difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B veroorzaken.

Komt je kind na de vaccinatie in contact met een van de virussen of bacteriën die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die je kind beschermen. **Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

## Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Je kind krijgt deze vaccinatie **3 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit wanneer je kind 3 maanden, 5 maanden en 12 maanden oud is. Je kind krijgt op dezelfde momenten ook de pneumokokkenvaccinatie.

Het kan zijn dat je kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van je kind.



Je kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind een **lichte ontsteking**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net als bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Slaperig zijn of huilen.
- Prikkelbaar zijn.
- Koorts.
- Minder zin hebben in eten of overgeven.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Diarree.
- Een verharde huid, blauwe plek of een bultje op de plek van de prik.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren van je kind? Overleg dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](http://apotheek.nl), [thuisarts.nl](http://thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](http://rijksvaccinatieprogramma.nl). Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](http://lareb.nl).