

# Vaccin in het kort voor het **DKT-vaccin voor kinderen**

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je kind tegen verschillende ziektes:

- **Difterie.** Een ziekte met ernstige ontstekingen van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Kinkhoest.** Een ziekte met ontstekingen van de neus, keel en longen. Klachten zijn onder andere veel hoesten en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Een ziekte die kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.

De ziektes difterie, kinkhoest en tetanus zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van je kind de bacteriën die de ziektes difterie, kinkhoest en tetanus veroorzaken.

Komt je kind na de vaccinatie in contact met de bacteriën die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die je kind beschermen.

**Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

Als je kind het volledige Rijksvaccinatieprogramma volgt is dit vaccin een **herhaling**. Je kind heeft als baby al vaccinaties gehad tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Na deze herhalingsprik is je kind langer beschermd tegen deze ziektes.

## Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt je kind deze vaccinatie op de leeftijd van 5 jaar.

Het kan zijn dat je kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van je kind.



Je kind krijgt de prik in de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind een **lichte ontsteking**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen difterie, kinkhoest en tetanus.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Slaperig zijn.
- Moe zijn.
- Prikkelbaar zijn.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren van je kind? Overleg dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).