

# Vaccin in het kort voor het **DTP-vaccin**

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je kind tegen verschillende ziektes:

- **Difterie.** Een ziekte met ernstige ontstekingen van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Een ziekte die kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.
- **Polio.** Een ziekte die kan zorgen voor een verlamming van de armen of benen.

De ziektes difterie, tetanus en polio zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van je kind het virus dat polio veroorzaakt. Ook herkent het lichaam de bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken. Komt je kind na de vaccinatie in contact met het virus of de bacteriën die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die je kind beschermen. **Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

Als je kind het volledige Rijksvaccinatieprogramma volgt is dit vaccin een **herhaling**. Je kind heeft op jongere leeftijd al vaccinaties gehad tegen difterie, tetanus en polio. Na deze herhalingsprik is je kind langer beschermd tegen deze ziektes.

## Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

Is je kind in 2016 of na 2016 geboren? Dan krijgt je kind deze prik in het jaar dat je kind 14 wordt.

Is je kind in 2015 of voor 2015 geboren? Dan heeft je kind deze prik al gekregen op de leeftijd van 9 jaar.

Het kan zijn dat je kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van je kind.



Je kind krijgt de prik in de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind een **lichte ontsteking**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Je kind is na deze laatste vaccinatie van de serie D(K)TP in het Rijksvaccinatieprogramma minimaal 10 jaar beschermd tegen tetanus.

**Heeft je kind na die tijd een wond die vuil is?** Met vuil van de straat of bijvoorbeeld nadat je kind door een dier is gebeten? Neem dan contact op met je arts. Je kind heeft dan misschien een nieuwe vaccinatie nodig.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen difterie, tetanus en polio.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood, of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Een verharde huid of een knobbeltje op de plek van de prik.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Koorts, hoofdpijn of duizelig zijn.
- Misselijk zijn, soms met overgeven.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over vaccineren? Bespreek deze dan met de jeugdarts of met je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](http://apotheek.nl), [thuisarts.nl](http://thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](http://rijksvaccinatieprogramma.nl). Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](http://lareb.nl).