

Vaccin in het kort voor het **Rotavirusvaccin (Rotarix)**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt tegen het rotavirus. Het rotavirus is heel besmettelijk. Het virus zit in de poep van mensen die zijn besmet. Het virus kan na een wc-bezoek verspreid worden via de handen. Het kan terecht komen op plekken zoals deurklinken, speelgoed en eten. Hierdoor komt het virus via de handen in de mond terecht. Kinderen worden vaker ziek door het rotavirus dan volwassenen.

Het rotavirus kan zorgen voor een ontsteking van de maag en darmen (buikgriep). Dit kan zorgen voor klachten zoals diarree. Een lange tijd last hebben van diarree kan vooral bij jonge kinderen leiden tot uitdroging. Erge uitdroging kan levensbedreigend zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Als je kind na de vaccinatie in contact komt met het rotavirus, dan herkent het lichaam dit virus. Het lichaam heeft dan al antistoffen aangemaakt die je kind beschermen tegen dit virus. **Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

Uit onderzoek blijkt dat de werkzaamheid van het vaccin 85% is. Dit betekent dat van de 100 jonge kinderen die zonder het vaccin in het ziekenhuis terecht zouden komen, er na vaccinatie nog maar 15 kinderen in het ziekenhuis terechtkomen.

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Je kind krijgt dit vaccin **2 keer**. Het Rijksvaccinatieprogramma adviseert dat je kind tussen 6 en 9 weken de **eerste** vaccinatie krijgt.

Je kind krijgt de **tweede** vaccinatie minimaal 1 maand na de eerste vaccinatie en maximaal **voor** de leeftijd van 24 weken. Het RIVM verstuurt hiervoor een uitnodiging.

Het kan zijn dat je een aangepast schema krijgt. Volg altijd je schema.

Dit vaccin is **geen** prik. Het is een vaccin dat in de mond van je kind wordt gedruppeld.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind last van **diarree** of blijft het **overgeven**? Overleg met de arts of je een nieuwe afspraak moet maken.



Heeft je kind een slechtere afweer door een ziekte of medicijnen? Overleg met de arts of je kind het vaccin mag krijgen.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het rotavirus.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen kan last krijgen van:

- Diarree.
- Prikkelbaar zijn.

Minder dan 1 op de 100 kinderen kan last krijgen van:

- Buikpijn.
- Winderig zijn.
- Ontsteking van de huid.

Ook heeft je kind een erg kleine kans op een darminvaginatie (het plotseling in elkaar schuiven van een deel van de darmen, waardoor de darm afsluit) door de vaccinatie. **Neem daarom direct contact op met de arts** als je kind last krijgt van de volgende klachten binnen 1 week na de vaccinatie:

- Erge aanvallen van buikpijn (vaak trekt je kind daarbij zijn beentjes op).
- Blijven overgeven.
- Slijmerige of bloederige poep.
- Een opgezwollen buik.
- Hoge koorts.

Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren van je kind? Bespreek deze dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op geneesmiddeleninformatiebank.nl. Of kijk voor meer informatie op apotheek.nl, thuisarts.nl of rijksvaccinatieprogramma.nl. Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.